

Рак полового члена классифицируется как редкое новообразование, однако в большинстве случаев его диагностируют на очень поздней стадии развития.

Причина — стыд и страх мужчин перед посещением врача. Заболевание чаще всего поражает мужчин в возрасте от 45 до 60 лет. Обычно встречается плоскоклеточный тип. Согласно медицинской статистике, от появления первых симптомов болезни до постановки диагноза проходит год.

Причины рака полового члена

Существует несколько теорий о причинах болезни. Она нередко встречается у мужчин, которые пренебрегают гигиеной своих интимных частей тела. Пот, кожный жир и грязь являются хорошей питательной средой для бактерий, вырабатывающих вещества, разрушающих нежную кожу крайней плоти.

Многие врачи склоняются к мысли, что заболевание — это результат работы метастатических раковых клеток, находящихся в других органах. Эти клетки по крови достигают полового члена. Другие причины включают фимоз, который бывает в 40-70% случаев рака этого органа. Детское обрезание предотвращает неопластические изменения. Курение также важно для развития болезни. Рак в два раза чаще встречается среди курильщиков. Факторами, способствующими возникновению заболевания, также являются предраковые состояния, частые воспаления головки органа и инфекции, особенно инфицирование ВПЧ.

Симптомы заболевания

Признаки развивающегося рака могут включать боль при мочеиспускании, зуд или боль в паху. Однако вы должны помнить, что подобные симптомы могут быть и сигналом других заболеваний, например, инфекции мочевыводящих путей, венерических заболеваний, дерматологических болезней и даже некоторых внутренних проблем. Однако они всегда должны побуждать мужчину обратиться к доктору. Только он, осмотрев больного и проведя анализы, способен оценить, в чем причина недугов. У

пациента может появиться болезненное покраснение головки и венечной борозды, утолщение в паховой области, деформация органа и неестественный отток мочи.

Еще один симптом — неприятный запах из половых органов. На половом члене также могут появиться красные или серо-белые пятна, язвы и бугорки. По мере прогрессирования заболевания рак будет проникать (распространяться) в фасцию Бака, а затем и в пещеристые тела. Со временем он метастазирует в лимфатические узлы в паху. Сначала атакуются поверхностные узлы, затем глубокие.

У опытного онколога обычно нет проблем с диагностикой заболевания, но диагноз ставится после проведения гистопатологического исследования материала. Если врач подозревает, что поражения доброкачественные, он проводит биопсию, чтобы оценить природу поражений.

Лечение заболевания

Оно всегда зависит от прогрессирования болезни и итогов патогистологических анализов. Если поражения не распространяются, опухоль и лимфатические узлы в паху удаляются. Когда онкологией поражена лишь крайняя плоть, лечение — обрезание.

Лучевая терапия — эффективное лечение этого типа рака, но оно используется только на ранних и промежуточных стадиях заболевания. Помимо облучения также применяется внутриканальное лечение. При этом раке оно предусматривает имплантацию радиоактивного изотопа иридия. Остановить развитие болезни можно с помощью химиотерапии и лечения лазером. В случае значительного продвижения опухоли необходимо хирургическое вмешательство. Его масштабы зависят от локализации и степени развития заболевания. Когда поражения расположены в самой головке, хирург выполняет глансэктомию. Это процедура, включающая частичное или полное удаление головки полового члена.

Иногда возникает необходимость частичной или полной ампутации полового члена и яичек. Эта процедура технически известна как частичная или полная пенэктомия.

Рак полового члена и ампутация

Частичная ампутация проводится по каким-либо медицинским причинам, чтобы мужчина мог нормально мочиться и поддерживать хотя бы некоторую половую функцию. Ампутация обычно выполняется под местной спинальной анестезией или под общим наркозом. Отток мочи временно перенаправляется между мошонкой и анусом.

При частичной пенэктомии обычно удаляется головка и несколько сантиметров здоровой ткани, чтобы предотвратить возвращение опухоли. После частичной ампутации органа допускается проведение процедуры реконструкции органа.

Радикальная ампутация — это удаление всего органа. Необходимо создать путь для физиологического мочеиспускания. Если также необходимо удалить мочевого пузыря, хирургу нужно создать стому. Во время операции мочеточники располагают таким образом, что моча может собираться в специальный мешок, который пациент прикрепляет к коже специальными пластырями и носит под одеждой.

Реконструкция органа после полной ампутации осуществляется редко. Но можно взять ткань из другой части тела и сделать ее похожей на пенис. Однако у такого пениса нет никаких физиологических функций, но он может иметь большое значение для мужской психики.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечения настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

Рак полового члена: как проявляется и лечится?

Добавил(а) Оля
02.08.22 12:15 -

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.

.