

Рак прямой кишки – это онкологическое заболевание, при котором первоначальный очаг появления атипичных, перерожденных, клеток располагается в прямой кишке.

По мере роста, опухоль распространяется, может прорасти в глубинные слои тканей или в просвет кишки. Наиболее часто при этом обнаруживаются метастазы в печени, легких, региональных лимфатических узлах.

Очевидна связь между мутациями клеток кишечного эпителия с наличием таких заболеваний, как полипоз, язвенные колиты, онкология других органов малого таза и так далее.

Конечно, имеют значение и наследственные факторы риска, и работа с токсичными, канцерогенными веществами, например, асбестом. Но наиболее интересна и показательна корреляция между уровнем жизни пациентов и развитием у них данной формы рака.

Большое количество природных жиров и белков, которое составляет основу рациона жителей экономически-развитых стран, приводит онкологию прямой кишки на третье место, среди других выявляемых раковых поражений (второе, после рака легких у мужчин!). А в регионах, где в пища бедна животными продуктами – Африка, Юго-Восточная Азия – процент заболеваемости этим недугом очень мал.

Стадии рака прямой кишки

Существуют специализированные, крайне подробные классификации, но, в целом, для общего представления о развитии любого онкологического процесса, достаточно деления процесса на четыре стадии:

Стадия I – небольшая, четко-локализованная опухоль в стенке или на слизистой кишки. Метастазов нет.

Стадия II – опухоль больше (до 5 см), но она все еще локализована только в прямой кишке. Метастазы могут быть единичные в лимфатических узлах здесь же, в клетчатке, окружающей кишку.

Стадия III – опухоль более 5 см, обхватывает кишку более, чем наполовину. В региональных лимфоузлах обнаруживаются множественные метастазы.

Стадия IV – опухоль прорастает в соседние органы и ткани. Метастазы обнаруживаются не только в соседствующих, но и далеких от первичной опухоли органах.

Симптомы и признаки

Одним из наиболее частых признаков данного заболевания являются кровотечения. Однако их трудно заметить, так как примеси крови находятся в каловых массах. Также, могут наблюдаться выделения слизи, гноя.

Другой симптом – нарушение работы кишечника. Тут могут нарушаться дефекация, консистенция кала, отхождение газов и так далее. Характерны чередование поносов и запоров, ложные позывы или недержание кала.

Боли возникают уже на более поздних стадиях, когда нарушается здоровье соседних тканей, сдавливаются нервные окончания. Или, если первоначально опухоль располагается ближе к анусу, то боли могут появиться достаточно рано.

Но очевидно, что данные симптомы, которые мы перечислили, могут сопровождать и многие другие заболевания.

И общие для других типов рака - снижение аппетита, утомляемость, исхудание, плохое самочувствие – могут лишь натолкнуть специалиста на мысль обследовать пациента дополнительно.

Для получения точных данных необходима дифференциальная диагностика – эндоскопия, УЗИ, томограмма, рентген, обследование печени на предмет метастазов, данные биопсии. Как правило, выявление рака прямой кишки происходит случайно – во время планового осмотра или в связи с какими-то общими жалобами на функции пищеварения.

Лечение

Терапия данного заболевания, практически, никогда не обходится без операции. Зато виды и технологии таких вмешательств – крайне вариативны: от полного удаления всего пораженного сектора кишечника, до удаления лишь части стенки с ушиванием образовавшегося отверстия.

При удалении части кишки может быть выведена колостома – отверстие, через которое каловые массы поступают наружу в калоприемник, спереди живота. Через некоторое время целостность кишечника может быть хирургически восстановлена, а колостома – убрана.

Сложность лечения рака прямой кишки в том, что эти больные, как правило, уже очень ослаблены, так как нарушена одна из основных функций организма – питание.

Кроме того, хирургические операции на таком сложном органе, как кишечник – одни из самых травматичных.

Конечно, тут могут быть проведены и химиотерапия, и радиотерапия, и иммунотерапия. Специальные лекарства и облучения призваны остановить разрастание опухоли, даже уменьшить ее, не допустить распространения метастазов.

Профилактика

Каждый человек может снизить вероятность развития у себя рака прямой кишки, употребляя в пищу или в виде пищевых добавок грубые пищевые волокна, антиоксиданты, витамины.

Если у вас уже имеются те или иные заболевания прямой кишки – полипы, геморрой и так далее – то стоит постоянно «держат руку на пульсе». Проведение эндоскопии и взятие проб тканей на анализ поможет выявить атипичные клетки и начать лечение онкологии на самой ее ранней стадии.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечения настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.